



ИСКУССТВО ЗАЩИТЫ

Курзат® Р

ФУНГИЦИД

Фунгицид для эффективной защиты картофеля, лука, огурцов и томатов от комплекса болезней

Курзат® P

ФУНГИЦИД

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КУРЗАТ® P

- Контроль болезней на обеих сторонах листа за счет перемещения препарата сквозь лист.
- Эффективен против возбудителей фитофтороза, альтернариоза и пероноспороза.
- Лечебное действие в течение 1–2 дней после заражения.
- Профилактическое и антиспоруляционное действие.
- Длительный период защитного действия по сравнению с контактными фунгицидами.
- Минимальный риск возникновения резистентности.
- Дождь через 3 часа после обработки не снижает эффективности действия.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

Действующее вещество: цимоксанил 4,2% + хлорокись меди 39,8%
Препаративна форма: смачивающийся порошок
Упаковка: 1 кг пакет

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Действующие вещества, входящие в состав фунгицида **Курзат® P**, дополняют друг друга. Хлорокись меди защищает растения снаружи благодаря ее контактному действию. Цимоксанил – локально-системный компонент, обеспечивает профилактическое, лечебное и антиспоруляционное действие. После обработки цимоксанил быстро проникает в растение и перераспределяется в листьях. Это компенсирует неравномерное распределение рабочего раствора на растениях при обработке.

Лечебное действие обеспечивается даже через 1–2 дня после обработки за счет реакции сверхчувствительности (цимоксанил останавливает развитие болезни благодаря капсулированию инфицированных клеток растения).


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата кг/га	Способ применения
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	2.5	Первая обработка профилактическая, последующие с интервалом 10–12 дней. Расход рабочей жидкости 400 л/га
Томаты	Фитофтороз, альтернариоз	2–2.5	
Огурцы	Пероноспороз	2.5–3.0	Первая обработка профилактическая, последующие с интервалом 10–12 дней. Расход рабочей жидкости 400 л/га
Лук	Пероноспороз	2.5–3.0	


ИСКУССТВО ЗАЩИТЫ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ:

ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ




ЗАЩИТА ОГУРЦОВ




ИСКУССТВО ЗАЩИТЫ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ:

ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ



ЗАЩИТА ОГУРЦОВ



Курзат® Р

ФУНГИЦИД

КУРЗАТ® Р – РАСШИРЕННЫЙ ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ

Следует применять профилактически, перед тем, как Вы заметите болезнь в поле. Программы защиты культуры должны начинаться с раннего выявления первичной инфекции, базируясь на прогнозировании болезней. На площадях, где такие методы не применяются, специалистам следует тщательно отслеживать локальные условия и начинать профилактические обработки, как только погода станет благоприятной для появления инфекции (осадки, высокая увлажненность и умеренная температура). В нормальных условиях интервал между обработками 10–12 суток обеспечивает хороший контроль.

В теплую дождевую погоду, которая ведет к более быстрым темпам развития инфекции и повышенному риску заболевания, интервал между обработками следует сократить до 8 суток.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Рабочий раствор необходимо готовить в день обработки в специально отведенном месте. Наполовину заполните бак опрыскивателя водой, и включите мешалку.

Курзат® Р легко смешивается с водой и его можно высыпать сразу в бак. Не выключайте мешалку во время заполнения бака водой и во время обработки. При приготовлении баковых смесей с другими препаратами сначала растворите препараты в водорастворимых пакетах, затем **Курзат® Р**, вододиспергируемые гранулы, растворы, основанные на воде, концентраты эмульсий, прилипатели, растворяют после **Курзат® Р**.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы узнать больше, обращайтесь в ТОО «Дюпон Казахстан»
г. Алматы, ул. Кунаева 77
тел: +7 727 321 23 03

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАШИМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ:



Виталий Кох
г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область
+7 701 705 86 79



Нурлан Кулмуратов
г. Шымкент, Алматинская, Туркестанская,
Кызылординская области
+7 701 705 75 09



Юрий Бодня
г. Кокшетау, Акмолинская область
+7 701 663 58 86

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ТАРНУЮ ЭТИКЕТКУ

Copyright © 2019 DowDuPont.
Все права защищены.